

Sadzeniaki ziemniaka – wymagania obowiązujące od 2015 roku

(zestawienie tabelaryczne)

Wyszczególnienie	Kategoria elitarne					Kategoria kwalifikowane	
	Przedbazowe		Bazowe			Unijna klasa A	Unijna klasa B
	Unijna klasa PBTC	Unijna klasa PB	Unijna klasa S	Unijna klasa SE	Unijna klasa E		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wymagania dla plantacji – w ocenie polowej²⁾ (procent liczbowy)							
rośliny innych odmian i nietypowe dla odmiany	0,0	0,01	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5
rośliny porażone czarną nóżką	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	2,0	4,0
rośliny z objawami mozaiki i oznakami liściozwoju (PLRV)	0,0	0,1	0,2	2,0	4,0	8,0	10,0
w tym: wirusem liściozwoju (PLRV)	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	2,0	6,0
2. Wymagania dla plantacji – w ocenie weryfikacyjnej (procent liczbowy)							
rośliny innych odmian i nietypowe dla odmiany	0,0	0,01	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5
rośliny z infekcją wirusową	0,0	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	10,0

Objaśnienia:

- maksymalna łączna liczba rozmnożeń w uprawie polowej, w obrębie kategorii przedbazowe (klasa PB) i kategorii bazowe **nie może być większa niż 7**; w przypadku braku na etykiecie informacji o numerze rozmnożenia, sadzeniaki **uznaje się jako należące do maksymalnego (ostatniego)** rozmnożenia w obrębie danej kategorii lub klasy (odpowiednio dla **PB** trzecie, dla kategorii bazowe (B) w tym: **S** piąte, **SE** szóste, **E** siódme itp.
- plantacja nasienna ziemniaka powinna być wolna od organizmów kwarantannowych, a w szczególności: gleba od *S. endobioticum*, *G. rostochiensis* i *G. pallida* oraz rośliny *Cms* i *R. solanacearum*.

Wyszczególnienie	Kategoria elitarne					Kategoria kwalifikowane	
	Przedbazowe		Bazowe			Unijna klasa A	Unijna klasa B
	Unijna klasa PBTC	Unijna klasa PB	Unijna klasa S	Unijna klasa SE	Unijna klasa E		
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Wymagania dla partii sadzeniaków ziemniaka – w ocenie cech zewnętrznych (procent wagowy)							
bulwy porażone grzybem <i>Rhizoctonia</i> spp.	0,0	1,0(10)	5,0(10)	5,0(10)	5,0(10)	5,0(10)	5,0(10)
bulwy z objawami suchej lub mokrej zgnilizny z wyłączeniem wywołanej przez organizmy kwarantannowe	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
w tym: z objawami mokrej zgnilizny			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
bulwy z wadami zewnętrznymi, a w szczególności bulwy niekształtne lub uszkodzone	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
bulwy pomarszczone z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
bulwy porażone parchem zwykłym	0,0	5,0(33,3)	5,0(33,3)	5,0(33,3)	5,0(33,3)	5,0(33,3)	5,0(33,3)
bulwy porażone parchem prószystym	0,0	1,0(10)	3,0(10)	3,0(10)	3,0(10)	3,0(10)	3,0(10)
Suma wad (pozycje wyszczególnione powyżej łącznie):	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0
ziemia i inne zanieczyszczenia	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
bulwy o nieodpowiednim kalibrze	–	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Objaśnienie

- wartości w nawiasach oznaczają procent porażenia powierzchni bulwy, powyżej której bulwę uznaje się za wadliwą