

Warunki wwozu ziemniaków do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

1. Bulwy ziemniaków muszą być wolne od następujących organizmów szkodliwych:

1.1 *Leptinotarsa decemlineata*

1.2 *Globodera rostochiensis*

1.3 *Meloidogyne* spp.

1.4 *Synchytrium endobioticum*


1.5 *Pseudomonas solanacearum*

1.6 *Clavibacter michiganensis* spp. *sepedonicus*

2. Występowanie poniżej wymienionych organizmów szkodliwych nie powinno przekraczać w bulwach nie powinno przekraczać

2.1 *Rhizoctonia solani*


10% bulw porażonych w stopniu słabym



Fot 1. Bulwy ziemniaka porażone przez *Rhizoctonia solanii* w stopniu słabym

2.2 *Streptomyces scabies* i *Spongospora subterranea* Pierwszy stopień skali opracowanej przez holenderską służbę ochrony roślin

(wyjaśnienie: pierwszy stopień ww. skali oznacza, że 50% bulw jest wolne od parcha, podczas gdy pozostałe 50% może wykazywać 1-2 płytkie uszkodzenia, pokrywające maksymalnie 1/32 powierzchni bulwy)



Fot 2. Pierwszy stopień porażenia bulw ziemniaka parchem (wg skali opracowanej przez holenderską służbę ochrony roślin)

2.3 Mokra zgnilizna	0%
2.4 Nicienie	0%
2.5 Sucha zgnilizna	½%

Włączając: *Phoma*, *Alternaria*, *Fusarium*, *Phytophthora*, Czernienie miąższu powstałe na skutek nieprawidłowego przechowywania

2.6 Wady zewnętrzne	1%
---------------------	----

Włączając: pęknięcia powstałe podczas wzrostu, deformacje, więdnienie, pękanie skórki

2.7 Poważne wady wewnętrzne	1%
-----------------------------	----

Włączając: duży stopień zsinienia, szarzenie miąższu, duży stopień szklistości miąższu, kiełkowanie >10 mm długości

2.8 Silnie zielone zabarwienie	3%
--------------------------------	----

2.9 Średnie wady wewnętrzne	3%
-----------------------------	----

Włączając: średni stopień zsinienia, puste przestrzenie w miąższu, brązowe plamy, średni stopień szklistości miąższu, kiełkowanie 5-10 mm długości

2.10 Skazy powstałe na skutek uszkodzeń zewnętrznych

< 2 cm średnicy i >3 mm głębokości	6%
------------------------------------	----

> 2 cm średnicy i > 3 mm głębokości	1%
-------------------------------------	----

3. Ilość gleby na bulwach nie powinna przekraczać 0,5% wagi ziemniaków.

3.2 Próbkki bulw powinny być poddane kompleksowym badaniom, ziemniaki powinny być umyte.

3.3 Ziemniaki powinny być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, poświadczające, że przesyłka jest wolna od chorób i szkodników, których wprowadzanie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest zakazane.